

Вакцина Превенар

Превенар.



Вакцина Превенар применяется для защиты организма от пневмококковых инфекций путем формирования мощной ответной иммунной реакции на *Streptococcus pneumoniae* (Пневмококк). Превенар для профилактического вакцинации применяется только у детей в возрасте от 2 месяцев до 5 лет.

Состав вакцины Превенар.

Выпускается в виде суспензии для внутримышечного введения в специальном одноразовом шприце объемом 1 мл, объем вакцины 0,5 мл.

Вакцина Превенар	1 доза (0,5 мл)
пневмококковые конъюгаты (полисахарид + CRM197):	
полисахарид серотипа 4	2 мкг
полисахарид серотипа 6 В	4 мкг
полисахарид серотипа 14	2 мкг
полисахарид серотипа 9 V	2 мкг
олигосахарид серотипа 18 F	2 мкг
полисахарид серотипа 23 F	2 мкг
полисахарид серотипа 19 F	2 мкг
белок-носитель CRM 197	20 мкг
вспомогательные вещества: фосфат алюминия, хлорид натрия, вода для инъекций	

Показания и противопоказания к вакцинации "Превенар":

Вакцина Превенар за многолетнее использование продемонстрировала высокую иммунологическую эффективность. Тем не менее, перед началом использования следует подробно ознакомиться с показаниями, а также противопоказаниями перед вакцинацией этим препаратом. В России существует практика, когда перед использованием вакцины "Превенар" у родителей требуют письменное согласие.

Превенар используют для формирования профилактического иммуномодулирующего эффекта в борьбе с такими заболеваниями у детей, как: менингит, сепсис отит (острый средний), пневмонию, бактериемию.

Противопоказания для применения:

Крайне высокая восприимчивость ко всем видам компонентов (если ранее было выявлено, при предыдущем введении вакцины), аллергии разного рода, крайне повышенная восприимчивость организма к противодифтерийному анатоксину. Противопоказано применение, во время острых инфекционных и заболеваний неинфекционного характера. Исключено применение в момент резкого обострения болезней хронической этиологии. Следует подождать когда болезнь войдет в стадию ремиссии, а затем с разрешения лечащего врача, можно использовать данную вакцину.

Схема вакцинации.

Как и многие другие вакцины, «превенар» также имеет четкую схему вакцинации и ре-вакцинации. Данную вакцину можно вводить в одновременно с вакцинами, внесёнными в национальный список вакцинации. Исключением является вакцина БЦЖ. Вводится вакцина исключительно внутримышечно, введение иными путями полностью запрещено. Областью введения являются передняя поверхность бедра (для детей до двух лет) и дельтовидная мышца у детей от 2 до 5 лет.

Дети от 2 до 6 месяцев:

В первые полгода жизни ребёнка вакцинация проводится по схеме - 3 дозы вакцины, с интервалом между дозами не менее одного месяца, первая вакцинация как правило проводится в возрасте двух месяцев. Ревакцинацию рекомендуют проводить в 12-15 месяцев.

В случае, если Превенар не использовали в первые шесть месяцев жизни ребёнка, вакцинация проводится по следующим схемам:

Дети от 7 месяцев до года:

2 дозы по 0.5 мл. Интервал между введениями не менее месяца. Ревакцинация на втором году жизни.

Дети в возрасте от года до 2 лет:

2 дозы по 0.5 мл. Интервал между введениями не менее двух месяцев.

Дети старше двух лет до 5 лет:

Превенар применяется однократно в виде 1 дозы объёмом 0.5 мл.

Побочные эффекты:

Превенар имеет побочные действия. Главным образом побочные действия после применения Превенара выражаются в виде таких местных и общих реакциях, как повышение температуры тела, зуда и отека в области введения вакцины и ограничения движений в конечности. Возможны следующие побочные действия: и уплотнение, изменения кожных покровов (зуд, крапивница, дерматит). Со стороны кроветворной и лимфатической системы может наблюдаться лимфаденопатия регионального характера. Со стороны нервной системы - судороги. Со стороны ЖКТ: диарея, рвота, а также общее снижение аппетита. Со стороны иммунной системы могут происходить достаточно серьезные аллергические реакции, включая отек Квинке, диспноэ, бронхоспазм, а также анафилактический шок.